

SUMMO ARCHIATRO BENEDICENTE.  
DISPUTATIONEM INAUGURALEM  
MEDICAM

De

# FEBRE QUAR- TANA INTERMIT- TENTE,

JUSSU ET AUTORITATE  
ILLUSTRIS AC GRATIOSISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ  
IN CELEBERRIMA ACADEMIA JENENSI,  
PRÆSIDE

UIRO NOBILISSIMO ET EXCELLENTISSIMO,  
DN. RUDOLPHO WILHEL-  
MO *Brausen*/

PHIL. ET MED. DOCT. PRACT. ET CHIM.  
PROF. PUBL. ORD. FACULTATIS SUÆ  
SENIORE GRAVISSIMO,

nec non S. R. I. Naturæ Curios. Collega Primario,  
HOC TEMPORE ACADEMIÆ RECTORE MAGNIFICO,  
*Domino Patrono & Promotore suo colendissimo,*  
PRO LICENTIA

SUMMOS IN ARTE MEDICA HONORES, PRIVILEGIA AC IN  
SIGNIA DOCTORALIA LEGITIME CAPESSENDI  
*publico examini subijciet*

JOHANNES ADAMUS SCHOTT  
MOENO-FRANCOFURTENSIS,

IN AUDITORIO MAJORI,

*Horis ante & postmeridianis*

*Ad diem Decembris Anni M DC LXXVIII.*





LIBERÆ  
SACR. ROM. IMPERII  
REIPUBLICÆ  
FRANCOFURTENSIS  
INCLYTO ORDINI  
SENATORIO,  
VIRIS  
GENEROSIS, PRÆSTRENUIS  
MAGNIFICIS, NOBILISSIMIS, AMPLISSI-  
MIS, CONSULTISSIMIS, PRUDEN-  
TISSIMIS,

DN. PRÆTORI  
CONSULIBUS,  
DNN. { SCABINIS,  
SYNDICIS,  
SENATORIBUS,  
PATRIÆ PATRIBUS, EVERGETIS  
PATRONIS ET PROMOTORIBUS SUIS  
ÆTATEM VENERANDIS,

DISPUTATIONEM HANC INAUGURALEM

DEDICARE

ET

SE

ET

SUA

STUDIA

QUAM HUMILLIME CONSECRARE

DEBUIT

VOLUIT

TANTORUM VIRORUM

SUBJECTISSIMUS

DEVOTISSIMUS

CULTOR

JOHANNES ADAMUS SCHOTT



IN NOMINE JESU!

*Proæmium.*

**N**Emini mortalium magis, quam Medico amplæ famæ necessarium esse studium autumo; tanti quippe æstimatur medicamentum, quanta præscribentis fama est, & auctoritas.

Famæ Medicorum juratus hostis est *QUARTANA* *INTERMITTENS*, & jam olim unâ cum aliis rebellibus morbis eò dementiæ adegit quosdam misiatros, ut ipsam Medicinam iverint negatum.

Intractabilis ipsius genius tam altas sæpè in imis viscerum medullis radices ponit, ut omnem, etiam exercitissimi Medici ludat operam. Mille sæpè formas induit, & fuste hæc expulsa parte, mox illac sub aliâ recurrit imagine. Atque licet nulla ætas aut inveniendis naturæ arcanis, aut debellandis morbis, hæc nostrâ illuxerit felicior; nihilominus tamen etiamnum hodiè quartana antiquum suum obtinet, & vulgò Medicorum audit opprobrium.

Hujus tyranni præfracta frons mei, meæque curtæ supellectilis me planè reddidit immemorem, ut loco Inauguralis speciminis vindicare famam medicam in animum induxerim. Quanquam autem me id affecuturum fermè desperem, dum huic Herculeo morbo me imparem ingenuè profiteor; in hunc tamen scopum collimasse



sufficiat, & aliqua forsan laudis pars erit, ejusmodi ausis vel excidisse.

Quoniam verò nostra in literis peregrinatio, sine supernâ luce, miserabilis est erratio, ideò Divinum imploramus Numen, ut illud in præsentî nostra sit cynosura, ne pro Junone amplectamur nubem.

## CAPUT I.

### *De Definitione nominali.*

**N**ucleum qui cupit, corticem frangat oportet. Sic qui rem aliquam ambiguis involutam proponit nominibus, illum eadem, cum non nisi cortices & involucra rerum ipsarum sint, antè evolvere & explicare oportet. Mihi in propositi affectus explicatione circa nominis evolutionem multum temporis & studii infumendum non erit; apertè enim in titulo Disputationis dixi, me acturum de FEBRI QUARTANA INTERMITTENTE, quod etiam ab eò, qui saltim limites Medicinæ attigit intelligi posse, nullus dubito.

Et quid quæso facilitatis accederet curationi operosa disceptatio, an *febris* ab antiquo verbo februare, quod idem est ac purgare, Germanicè *fegen*/unde Februarius Mensis & Juno februata dicuntur; An verò à fervere, quia sanguis in febribus effervescens totum corpus fervere seu incalescere facit, melius deduci possit? Ne hilum quidem, possunt ergò de his legi Autorum Lexica, inter quæ evolvi meretur Cornucopiæ Nicolai Perotti.

Sic etiam notum est, quod *Quartana* audiat à periodo quarto quòvis die remeante: namque utrum febris aliqua tertiana sit, an quotidiana, an quartana, ex intervallo, quod inter accessiones est, colligitur.

*Intermittens* dicitur, quod ejus faces non continuïs ardeant ignibus, sed biduanam habeant intermissionem & tantùm quartus quisque dies tortor evadat, secus ac in *Quartana* continua fieri observamus.



Inde quoque satis liquet ab homonymiâ seu ambiguo significatu liberum esse hunc titulum; nisi enim aliquis forsan molestias vel labores quarto quovis die recurrentes ita insignire vellet, vix reperio, cui commodè applicari possit.

Alio quidem nomine me affectum istum insignire potuisse non diffiteor, siquidem memini plurimis absolutè quartanam dici. Sic *Plinio* febris quatrina, aliis morbus quartanarius audit. *Mercurialis* existimat, hanc esse febrim illam, quam *Lucilius* & *Plautus* Querqueram vocant, à sonitu, quem tremore & frigore afflicti paroxysmantes edunt. Novi quoque eam vocari melancholicam, febrim à causa ipsius, juxta veteres, efficiente, ut & scandalum atque opproprium Medicorum, ideò, quod rarò aut vix omninò generosis licet medicamentis cedere soleat, unde *Schola Salernitana* non immeritò ingeminat: Hydrops, quartana Medicorum scandala plana; potuissem, inquam, eòdem quò alii fecerunt jure hanc meam disputationem hîc vel aliis quoque intitulare nominibus, sed, cum risu potius quàm laude excipiendos censeam eos, qui circa crustas ac testas rerum diu præter necessitatem occupantur, & sic ingenii sui acumen frustrà exercent, ideò curationi, & quæ ad illam facilitandam conducunt intentus, mitto hæc, apertè rem sub aspectum quasi subjiciens, & Græcos imitatus, qui πυρετὸν τεταρταῖον vocant. Germani dicunt: Das viertägige Fieber.

## CAPUT II.

### *De Definitione reali.*

**M**ISSIS itaque his, ad ipsam affectus nostri naturam dilucidius tradendam, sive ad definitionem me accingo, quæ quanquam à variis variè proponatur, in sequenti tamen hâc vice acquiescere apud animum constituimus. FEBRIS QUARTANA INTERMITTENS est calida totius corporis intemperies, ab humoribus acidis austeris, in infimo ventre copiosè stagnantibus, præternaturaliter fermentantibus & circulationis lege, statis temporibus per vasa chyli ferat toti massæ sanguineæ comunicatis, in corde accensa, &



& in totum corpus diffusa, quarto quovis die graviter, cum horrore vehementissimo & dolore dorsi quasi ostocopo paroxysmans & cum debiliore pulsu actiones sensibilibus lædens.

*Genus*, quod in accidentibus rationem formalem & essentiam constituit, est calida intemperies totius corporis, & hoc cum omnibus febribus commune habet.

Intemperiem esse patet 1. *ex essentialiter inherentes* in omni febris requisitis, calore scil. igneo; ex Pergameni enim testimonio *l. 3. de fract. c. 8.* τῆς δὲ τῆς πυρετῆς εἶναι, ἔχειν θερμότητα πυρετῶν, ea est natura & essentia febris, igneum habere calorem, deinde pulsu mutato, & hic loci frequentiori. 2. *Ex essentialiter consequentibus* symptomatibus actionum læsarum cujusvis facultatis, in capite de signis recensendis.

Calidam esse intemperiem ex sensu & effectibus patet; licet enim vehemens præcedat horror & frigus, hæc tamen non tam ad febrim pertinent, quàm illam præcedunt, insuper etiam non tam diu durant ut calor, ideò à potiori & essentiali meritò fit denominatio.

Consistit verò hæc intemperies in dispositione p. n. partium simularium, quæ quidem mediantibus primis qualitatibus agit, his tamen non absolvitur, sed ad acidum, austerum, viscidum &c. accedit. Estque calor extraneus non tantum gradu differens à calore animali, sed & generationis modo, & causâ, quatenus expugnâ humorum peccantium cum naturali oritur calore, & hunc ipsum etiam destructum it potenter.

## C A P U T III.

### *De Subjecto.*

**T**urpe duci bellico est hostilis exercitus situm ignorare; ex huius nempe cognitione accuratâ, quâ parte irruentibus turmis contraeundum sit, patescit facilè: Medici quoque magni interest ut morborum subjecta probè perspecta habeat. Non solum oras & littora microcosmi morborum circumvallant agmina; sæpè ex  
imi



imis etiam viscerum medullis regia impugnatur sedes. Quò igitur & nos succumbenti magis parti succurrere queamus, postulat necessitas ut subjectum rimemur intimiùs; illud verò est vel principale, vel minus principale. Principale subjectum, quod primum & principaliter in febris hâc laborat, & sufficienti vi in reliquas partes tantum æstum diffundendi pollet, seu locus ubi radicatur affectus est COR; Id quod non paucis rationum monumentis probare possemus; quædam saltim ut commemorem.

Cor vitalis flammæ in statu f. n. dispensatorium est, eoque existente salvo, etiamsi reliquæ partes calore p. naturali urantur, nunquam tamen prius excitatur febris, quàm post ejusdem cum corde communicationem, *Vid. Rolf. O. & M. cognosc. & curand. febres generalis cap. XXIV. ut & O. & M. consultatoria lib. IV. conf. 4. & seq.* eundem namque naturalis & p. n. caloris fontem esse necessum est. Insuper pulsus mutatus ceu effectus cordis haud dubiè testatur de affectâ parte.

Afficitur verò cor potissimùm quoad partem solidam, hæc enim ab inquinato & corrupto sanguine per axillarem & cavam venam ad cordis ventriculum dextrum adfluente, calidam contrahit *δυσπνοίαν*, & non solum fermentò hóc omnem quem generat sanguinem inquinat, sed etiam sic qualificatum per arterias in totum mandat corpus.

Horroris subjectum principaliter est panniculus carnosus quoad membranas suas, qui inæqualem sanguinis affluxum non benè fert.

*Secundarium & cause* subjectum seu focus mali sunt tum viscera chylum præparantia, & ad cor deferentia vasa, tum depurantia sanguinem.

*Helmontius* statuit, aciditatem chyli immediatè lienem petentem, mox exhibere quartanam. Aliàs *libro de febribus cap. 10. p. 769.* omnium febrium nidum in infimi ventris visceribus ponit.

Veteres soli lienem omnem culpam tribuerunt, qui communiter pro primariò hospitio excrementorum crassorum, cœnoso- rum feculentorum & *Υ*eorum habetur, & hunc per *πρωτοπύθεις*, reliquas partes per *συμπύθεις* affici putabant. Hanc verò sententiam ut nostram faciamus tantum abest, ut potius lienis



affectus sæpius pro effectu quartanæ habeamus; ita ut materiam morbificam eò loci, ut & ad hepar à robustioribus partibus depulsam impingi ibidem & stagnare nulli dubitemus. Insuper uni soli visceri primariam mali sedem semper adscribi posse, vero non consentaneum; sed modò hoc, modò illud magis affici, singula tamen suum conferre symbolum putamus.

Hæc enim mutuas sibi exhibent operas, & cum in eundem conspirent effectum, conjunctam inter se habent necessitudinem, ut alterum alterius vitia & negligentiam in concrevitâ operâ persentiscat facilè. Nihilominus pro originali & generationis subjecto, ubi prima mali ponuntur stamina, ventriculum microcosmi promumcondum venditamus. Qui tùm culpâ propriâ, ob læsum ejusdem tonum loco chyli pravas gignit cruditates, tùm ob ipsorum ingestorum vitium coctionis officio perfectè fungi nō est aptus. Sicuti verò soli huic chylificationis opus in statu secundum naturam neutiquam tribuimus, sed hepatis & pancreatis operam hinc quoque necessariam judicamus; ita si illa vel nulla, vel vitiata contribuunt menstrua chylum inquinant & corrumpunt, debitâque *κράσις* & *πρόμαλωσις* privant, & inter subjectum causæ non injustè numeranda sunt. Deferentia denique vasa, ut intestina, mesenterium & ductus thoracicus, non rarò, quatenus materia peccans horum parietibus adhæret, numerum subjecti causæ cumulant.

## CAPUT IV.

### *De Causa immediata, & mediatis proximioribus.*

**N**on agniti morbi nulla est curatio, omnium rerum cognitio per causas acquiritur. Harum igitur evolutioni ut studeamus operæ pretium videtur.

*Immediatam* Quartanæ causam vitiosorum humorum e infimo ventre congestorum, cum massâ sanguineâ in corde con fusionem statuimus, quæ ob heterogeneitatem cum M.S. effervescentiam excitando paroxysmum febrilem constituit, cum enim



illi humores rarefactioni naturali, & sanguinis generationi minus apti sint, archeus tam promptè illos nequit subigere, ideò pugnam cum iis toties init, quoties nova infunditur materia, quam necessariò horror & frigus præcedunt, quia in illâ disceptatione, cor non potest non aliquàlter impediri in actionibus suis, unde quoque minùs liberè undiquaq; distribuitur calor & M. S. cuius inæqualis illapsus in membranas panniculi carnosì frigus & horrorem immediatè causatur. Accedit, quod materia peccans in chylo, cordis calori sit contraria & effectivè frigida, quæ reliquum concentrando sanguinem multum ad horrorem inducendum confert, & per accidens tantum, ex pugná seu effervescentiâ rarefactionem vitiosam, & calorem producit p. n. *Helmont. libro de febribus cap. IX. pag. 766.* deducit eosdem ab archeo, qui excutere intēdit per tremulos rigores adherens parti similari excrementum, perinde ac aranea suos quatit casses, ut excutiat illapsa. *Sylvius lib. 1. prax. pag. 215.* omne frigus in febribus deducit à succo pancreatico acidiori. *Harveus* causam frigoris refert in sanguinem fixum, *Exercitat. 50. pag. 193.*

*Mediata proximior* est chylus, qui sicuti in statu s. n. blandâ dulcedine gaudet, & amabili evolutione evaporare & spirituasceere solet; ita hîc non tam qualitatibus primis, caliditate, humiditate, frigiditatevè nimîâ peccat, quàm secundis, quatenus crassus, viscidus, tenax, austerus, scorbuticus & acidus existit. Ob quam constitutionem, in regiâ ad cor meando viâ, tamdiu moras necit, obstructionsque particulares venarum lactearum, & ductus chyliferi causatur, usque dum collectam quantitatem vasorum cavitas capere renuit. Quò factò à nimîâ repletionē turgentia vasa, sollicitante archeo & horum discussionem urgente in cordis dextrum ventriculum sese exonerant, qui in laudabilem sanguinem rebellem hanc, & magis coagulantem, quàm rarefactioni aptam materiam versurus, pulsum celeriores excitat.

In naturali enim statu post paucas horas à cibo sumpto, cum chylus jam per venas Asellianas ad cor, ceu perfectorium suum pertingit, citatiorem cordis motum percipimus, quod materiam adhuc aliquàlter crudam subigere allaborat. Imò sæpè horror leviculus ob jam datas causas conjungitur. Quid igitur obstat.



quin dicamus chylum ad cor ablegatum eò citatiorem pulsum  
 excitare, quò longius à statu naturali distat? nec silentio præter-  
 eundum, quod ipse chylus non parum conferat ad citatiorem  
 excitandum pulsum. Sicuti enim veteres cum recentioribus in  
 eò consentiunt, in quantanâ sangvinem à dulcedine suâ balsa-  
 micâ desciscere, & in aciditatem & austeritatem transire; ita, li-  
 cet hodiè non toti MS. sed soli chylo id tribuamus; nihilomi-  
 nus ejusmodi humorum cum alcalinis  $\Delta$ reis sangvinis particu-  
 lis miscellam sine effervescentia fieri non posse, notum est ex  
 chymicis principiis. Videre id est in præparatione  $\Phi$ ri  $\Theta$ lati,  
 ubi  $\sim$ us  $\Theta$ li cum  $\Theta$ e  $\Phi$ ri conjungitur, item in præparatione  
 arcani  $\Phi$ ri, fixatione  $\Theta$ ium volatilium &c. hanc verò efferve-  
 scentiam mediante motu, calorem p. n. inducere nemo sanio-  
 rum chymicorum hodiè negare audet. Chyli verò pravi con-  
 fectionem & ejus  $\mu\omicron\lambda\upsilon\sigma\mu\omicron\nu$ , acceptam ferimus partim debili ca-  
 lori ventriculi & ejus tono & fibris laxatis, tùm in se considerato,  
 tùm respectu subigendorum ciborum, vel qualitate, vel quanti-  
 tate peccantium, ubi ingestorum vincula ab invicem disjungi  
 ritè nequeunt, & nimis citò transmittuntur, nec homogenea ab  
 heterogeneis separari possunt, multæque  $\nabla$ tres, limosæ &  $\Phi$ rea  
 secernendæ particulae in chylo remanent; partim ejusdem vitia  
 to fermento; hoc enim si ex naturali volatili aciditate ad sol-  
 vendos cibos aptissimâ in præternaturalem acorem fixum abit  
 ingesta quælibet coacescere faciliè facit, suoque proprio signat  
 caractere, ut ita acido salinæ particulae, suppressis reliquis, ra-  
 ptim exaltatæ fluorem nanciscantur. Quid ergò mirum, si hæ-  
 partes crassiores intestinorum parietibus firmitus impactæ rebel-  
 les gignant obstructions? purioribus & tenuioribus confusæ il-  
 las in coagulum abire faciant? non secus, ac à quovis liquore aci-  
 do lac coagulati videre est. Ad hanc verò chyli p. n. constituti-  
 onem multum conferunt ex pancreatis glandulosâ substanti-  
 retundans succus acidus, & ex vesiculâ biliariâ emissus lixi-  
 vio  $\Delta$ reus liquor; qui sicuti in naturali statu per effervescentiam  
 blandam vel potius  $\sim$ tionem, utilia ab inutilibus segregant,  
 ita in hoc casu ob dispositionem suam præternatur. omnia magis  
 confundunt.



confundunt, in vasa  $\pi$ ant, & deteriori qualitate chylum imbuunt, ipsumque ad naturalem rarefactionem ineptum reddunt. Quo in negotio etiam aliquid contri-  
bunt glandulæ intestinales, quæ chylo juxta ac ipsi lymphæ characterem acidum fermentativum imprimunt.

Veteres hîc loci accusant putridos vapores exhalantis humoris melancholici p. n. seu atræ bilis, quæ ex adustione seu torrefactione humorum reliquorum sanguinis, pituitæ, cūprimis  $\Theta$ sæ, bilis flavæ, aut succi melancholici est facta. Alii quartanam à melancholiâ alimentariâ deducunt, quæ cū hodie explosa sit, ut non ens nullis gaudebit affectionibus. *Willisus tractatu de febris pag. 99.* pro causâ habet sanguinis â naturâ dulci,  $\pi$ osâ & balsamicâ ob  $\pi$ uum penuriam & partes  $\pi$ reas nimis exaltatas, & in fluorem evectas, in acidum & non nihil austerum, instar vini acescentis transitum, quem sanguinis statum chyli dyscrasiam, ut effectus suam causam sequi nos statui-  
mus. *Hartmannus in praxi pag. 887.* atram bilem, & succum pancreaticum copiosum, ut & lienis, â crassis humoribus oriundas obstru-  
ctiones accusat.

*Sennertus libro de febris pag. 70.* cū veteribus â melancholiâ quartanam deducit, quam quia acidam simul statuit, & sapore variegatam pro causâ haberi non incongruè potest. *Paracelsus* uti in omnibus intermittentibus, ita etiam in quartanâ accusat fermentum  $\Delta$ ro- $\Delta$ reum, seu  $\Delta$ eum, ebullitionem sanguinis p. n. & effervescentiam excitans, quem etiam pressio pede sequuntur *Hogelandus, Kergerus libro de fermentatione, pag. 233.* & plurimi chymici. *Sylvius libro praxeos pag. 213.* & *Grafius de succo pancreatico cap. 11. pag. 635.* pro causâ agnoscunt succum pancreaticum, aliquâ sui parte in uno pluribusve pancreatis ductibus lateralibus obstructis stagnantem, ac morâ acriorem factum, viâque vi tandem paratâ, in intestina effusum, vitiosamque ibi cum bilis particulis lixivis &  $\circ$ osis effervescentiam excitantem, quem ad dextrum cordis ventriculum delatum modò majorem modò minorem excitare calorem unâ asserit. *Helmontius de febris cap. 11. pag. 770 & 771.* in ultimâ alimenti digestione causam ponit, ubi dum partes solidæ sibi è sanguine student assimilare nutrimentum, sæpè inter assimilandum degeneres alterationes fieri statuit, has verò ab admistione rei extraneæ impressione pere-



grinâ, indignante & accenso archeo, & denique inquinato à scoriis chylo deducit, quas *ens anoyum* appellat. *Timæus von Gilden-Elle lib. 4. Epistolar. medicinal. epistol. 7. pag. 739.* accusat  $\Theta$ sum, crassum & impurum chylum, multum materiæ feculentæ circa lienem, mesenterium & vicina viscera cumulantem, concurrente corporis constitutione melancholicâ, quæ putredinem concipiens, in febrim exardesceret.

Quoad essendi modum peccat chylus *quantitate*, quatenus venas lacteas & ductum thoracicum replet, & tensione doloriferâ gravat. *Qualitate*, quatenus  $\sim$ uo.  $\Delta$ reæ particulae in acorem versæ sunt, & subjugatæ balsamicæ dulces, acidis fixis dominium cesserunt, quæ totam M. S. plus quam Vatimiano prosequuntur odio, sic, ut in quovis commissionis momento totum contremiscat corpus, dubioque marte calor dimicans ad tempus succumbere cogatur. His interea  $\Theta$ inis fixis particulis se admiscet  $\nabla$ æ, limosæ, quæ ab acidis arreptæ in  $\mathbb{F}$ rum abeunt, & circulationi sanguinis neutiquam velificantur. Quocirca denique etiam *motu* peccat chylus, quatenus non ut in statu s. n. ab assumpto cibo in dextrum cordis ventriculum per venas subclavias sese ritè exonerat, sed partim in vasis deferentibus stagnat & in glandulis turgescit quasi, partim aliquam portionem relinquit, in novum fermentum fatiscentem, quo accedens denuò alius contaminetur idem, & factâ accumulatione ipse congestus & protrusus in M. S. commercium veniat, & novam ipsi pugnam intendet. Viæ ordinariæ sunt vasa lactea, & ductus thoracicus, quandoque ut aliàs ab archeo materia peccans certi cuidam visceri vel pluribus infixæ, per horum venas extraordinariè cordi communicatur.

*Modus fluxionis* naturali chyli circulationi debet originem, quæ hîc ob ineptitudinem materiæ è vasis suis tam promptè non eluctantis, tam diu impeditur, usque dùm membranulæ vasorum sustentandæ copiæ incapaces, à particulis ferinis, aeribus lancinatæ, quomocunque possunt, contenta eliminant & cordi communicant. Cum verò ob materiæ genium, per moram parietibus vasorum, non secus ac in aquæductibus limosiores particulae adhærescant; ideò illæ tantum communicantur cordi, quæ magis fluxiles sunt & à reliquis crassioribus obstructio horum vasorum non quidem totalis, partialis tamen sæpissimè inducitur.



15  
CAPUT V.

*De causis mediatis remotioribus.*

**H**Æ sicuti triplices ab autoribus statuuntur; ita I. inter *naturales*, merito primum locum occupat *Temperamentum* h̄inum melancholicum, frigidum & affectioni hypochondriacæ obnoxium; quod vel à causis externis vel peculiari ejusdam visceris primarii temperamento inductum, activas in corpore particulas, sub acidi fixi captivat jugo, & obstructionum est feracissimum.

*Hereditaria dispositio*, quam sicuti à parte matris, de ejusmodi  $\Theta$ e acido fixo participantis, & vel in utero per sanguinem simili diathesi infectum, vel extra uterum, lacte soboli communicantis, multum conferre h̄ic posse, nemo facile dubitat: undè in utero materno quartanam congenitam notavit *Schenckius l. 6. observ. med. obs. 38. pag. 48. 7.* ita à parte patris multis negativa placet. Cum enim non omne semen ita ad generationem concurrere, ut in foetus substantiam, mole & corporaturâ suâ totum concedat, vel ex plantis didicere; ideò cum crassioribus particulis, pelliculæ tantum & involucri vice fungentibus morbificam materiam secerni sibi persuasum habent. Nihilominus ipsam nobiliorem seminis partem, quæ plasticam virtutem secum continet, scorbutico quodam  $\Theta$ e characterisatam esse putamus in iis, quorum M. S. talismodi atomis inquinata extat. Effectus enim suâ causâ nobilior esse non potest.

*Ætas* quidem consistens & in *Sanguine* constituta, ab anno 25. minus resistit quartanæ, sic ut adultiores ut plurimum sæpius & gravius afficiantur, quia in illis sanguis à balsamicâ suâ dulcedine sensim in aciditatem  $\Theta$ licam desciscit, quo & ipsi jamjam inclinant ~us; nihilominus quandoque Tros Rutulusve capiuntur eâdem, ut hanc quoque ullo sine ætatis discrimine epidemicè grassatam fuisse annotaverint Autores. Sic infantem trium mensium quartanâ laborasse annotavit *Sennertus libro secundo de febribus cap. 20. pag. 296. cap. 2. pag. 24.* idem habet *Willisus lib. de febrib. pag. 100.*

*Sexus* sequior ob temperamentum frigidius, vasa minora, & vitam sedentariam, ubi ventilatio sanguinis non ita ritè peragitur, ob-

structio-



structionibus magis est obnoxius, nihilominus cum per menses, si hi quidem rectè ambulent, multum dyscrasie vitiatæ iterum deponitur, vix universaliter deterior hujus fors nobis visa est. Quanquam nec gravidæ ab hujus insultu maneant liberæ, juxta observationem *Excell. atque Experientiss. Dn. D. Wedelii*, Præceptoris mei honoratissimi.

Inter NON NATURALES, quæ ad hoc malum producendum vel disponunt corpus, vel materiam præbent, excellit aer frigidus, Borealis, crassus, nebulosus, falsâque aciditate minus frigente, inquinatus, cujus mutatio sola sæpè malum hoc non minus acceleravit, quàm sanavit. Talis verò occurrit 1. vel ob anni tempus autumnale, quod ideò huic affectui ferè proprium est, ut rariùs quartanam oriri videas, nisi hoc ipso anni tempore, vid. *sect. 3. aphor. 22.* cum enim ab æstivo calore plurimum minus & ærearum particularum sanguinis avolarit, quod reliquum est, faciliùs à frigoris acido constipari potest (non secus ac vinum à nimia effervescentiâ acescit) & in naturam acidiusculam & Æream cum *πυλμαρσις* defectu, facile degenerat. *Hippocrates* quidem *Sect. 3. aphorism. 21.* æstate etiam quartanas fieri statuit; quod tamen in nostris regionibus rariùs contingit, vel saltem extraordinariè. 2. vel ob soli & cæli constitutionem, unde imprimis in locis maritimis hic affectus endemius esse solet, sic ut plurimos illic degentes, aut aliorum adventantes confestim invadat. Ille verò non solum per vasa pnevmonica attractus noxam infert corpori; sed etiam per cutis spiracula cum sanguine communicatur & passim nervosas partes aciditate suâ lædit, ventriculi calorem destruit, sanguinis retardat circulum, & ad febrilem hanc diathesin sanguini inducendam aptissimus est.

*Astrorum influxus* quoque non est de nihilo, imprimis omnibus infaustus huius, juxta *Rolsinc. O. & Meth. libr. 2. sect. 3. cap. 52. pag. 120.* in sextâ retrogradus quartanas inducere dicitur. Qui eò pertinacius malum fovet, quò minus felici aspectu 4is, ☉is vel ♀ris mitigatur & contra.

*Cibus & potus* sicut modicè assumtus ad sanitatem corporis nostri conservandam multum confert; ita si vel quantitate vel qualitate ingesta peccant, strenuè sub causarum militans vexillo.



Si enim in nimia ingeruntur copia, stomachale obruunt fermentum, unde centrali ingestorum resolutioni impar ventriculus uniendo & segregando crudum generat chylum,  $\nabla$  eis, viscosis, acidis, uno verbo  $\nabla$  eis particulis refertum, qui obstructions postea causatur varias. Huc etiam pertinet ciborum diversorum & contrariorum assumendi consuetudo, qui simili caloris gradui non omnes æquè obsecundant, sed hi celerius, illi tardius egrediuntur iterum, quò & cibandi tempus inordinatum spectat, ubi priori nondum perfectè concocto novus iterum superingeritur cibus, vel quando post cibum sumtum potu nimio inundatur quasi stomachus, ubi præsentaneæ cruditates generantur & coctio non secus ut in olla, per iteratam  $\nabla$  æ affusionem retardatur. Sin verò qualitate peccent cibi, necessariò horum genium ipse chylus servat. Sic cibi crassi, viscosi, fumo nimis induratae carnes vel sale & muriâ conditæ, item vitulinae, & pisces insalubriores, panis furfuraceus, non satis fermentatus, cerevisia feculenta & acida omnia crassum, viscidum & acrem generant chylum, quò & acetum pertinet, à cuius nimio usu solo quartanam exortam notârunt autores; Licet enim & potu & fotu stomacho conducatur, facile tamen si excedatur, in ejus usu, volatile acidum fermentum ventriculi in fixum mutat acorem, qui characterem suum ipsi chylo tam firmiter non rarò imprimit, ut  $\Delta$  reæ ab hoc ligatae particulae exaltari postea maneant nesciæ. Tabaci fumus quoque excessivè & à repletionem stomachi haustus, nutritium serum absumendo viscidum producit chylum. Et licet sanis omnia alioquin sana sint; nihilominus in iis qui vitam amant sedentariam, & ventriculo gaudent laxiori, toto die, ex errore diætæ, morborum ilias provenit.

*Somnus immodicus* cruditates in ventriculo accumulatur, totumque corpus ferosò replet latice, undè minus diffillantur excrementa, undè natus calor obtunditur, omnesque actiones sensim torpescunt, & procrastinantur. Contrà *Vigilia*, & præcipuè lucubrationes nocturnæ,  $\sim$ us & calorem potenter perditum eunt, acidus verò in corpore relinquunt humores. Nec tunc perfecta fit chylicatio, cum archeus pluribus intentus minoris ad singula perficienda est efficaciam. Unde succosa chyli dulcedo sensim labascit, & in acorem vertitur, quem  $\sim$ us dispersi & absumpti temerare amplius non possunt.

Non minùs *motus* nimius dissipat  $\sim$ us & absomit serum blandum



dum. Intempestivus verò, & statim post pastum institutus chylum crudum in vasa  $\pi\alpha\tau$ at, & ejus aërosi struit insidias. *Quies* contra assidua totum retardat sanguinis circulum,  $\Delta$ reas particulas suffocat, excrementa cumulat, & coctionem ventriculi, chylique distributionem imminuit.

*Excreta & retenta* substantificè augendo materiam peccantem, non parùm adminiculi præbent. Sic à mēsis obstructis notarunt quartanam alii, alii eandem ab hæmorrhoidibus clausis observarunt, quatenus stagnando, ut  $\nabla\alpha$ , humores capiunt vitium, nativumque obruunt calorem. Huc etiam transpiratio prohibita, alvus adstricta, &  $\square\alpha$  suppressio pertinent, quæ planè simili modo ad quartanæ generationem concurrunt, & excrementa in toto augment corpore.

*Animi pathemata* ab adueto commota statu naturali varias inducunt corpori mutationes. Potissimùm metus, terror, & mœror suffocant  $\sim$ tus, nervos debilitant & laxant, totumque corpus refrigerant, unde in quartanâ producendâ quantum cooperentur patefcit.

III. PRÆTERNATURALES res causarum agmen claudunt, inter illas autem eminet *δυσμεγεία* viscerum coctioni & depurationi alimentorum destinatorum, ob quam officio suo, non nisi imperfectè funguntur, quò & obstructiones vasorum pertinent. Contagium parum, vel saltem rarius hîc quid confert, cum ob fixitatem particularum peccantium miasmatum communis vector tam promptè horum atomos secum abripere nequeat. In epidemiâ tamen quartanâ aërem multum conferre & in hōc modō malum communicari certum est. Insuper febres continuæ & intermittentes, eæ tamen magis diuturnæ & quivis morbi chronici, potissimùm verò scorbutus, affectus hypochondriacus & melancholia hypochondriaca, qui archeum heluonum in morem depopulantur, & viscerum tonum dejiciunt in quartanas creberrimè abeunt. A vermibus quoque in puellâ novennali annotavit quartanam *Forestus lib. observat. de symptom. febr.*



## CAPUT VI.

*De Differentiis.*

**Q**Uanquam quartana communiter ab autoribus in continuam & intermittentem distinguatur; de hac tamen, ut ex præmissis patet, in præsentiarum tantum solliciti sumus, & quidem ratione generis quartana alia est exquisita, & legitima, quæ simplicem febris servat tenorem, alia spuria, quæ affectum hypochondriacum, vel scorbutum conjunctum habet, & hæc pluribus aliis symptomatibus stipata est; alia quoque est simplex, alia duplicata, vel triplicata, quæ duæ ultimæ appellationes tamen non adeò conveniunt quartanæ, nisi ubi simplex præcesserit. Ratione *subjecti* alia magis ab affectu totâ M. S. dependet, ut in epidemiâ & hæreditariâ fieri necesse est; alia ex ventriculo oritur, cui modo pancreas magis, modò magis hepar ferunt suppetias, quæ lienem & mesenterium quoque afficere posse non incongruum est. Ratione *causæ* alia à soli & aeris constitutione oritur, alia ab hæreditariâ dispositione, alia à victus ratione, alia à prægressis & concomitantibus morbis aliis. Ratione *temporis* 1. *durationis* alia est pertinax & rebellis, alia aliquvaliter mitis, sic tamen, ut chronicorum morborum limites non excedat, alia longiores amat paroxysmos, alia breviores. 2. *invasionis*, alia est fons, recens; alia in facto, inveterata. 3. *anni*, alia autumnalis, alia hiemalis, alia etiam vernalis. Ratione *accidentium* alia essentialis est, alia symptomatica, per epigenesin & metaptosin facta.

## CAPUT VII.

*De signis diagnosticis.*

**I**ncognitum qui profligare tentat morbum, Antabatarum more clausis pugnat oculis. Cognitio intimior per causas ex signis diagnosticis eruitur, hæc igitur juxta methodum jam tractanda veniunt. *Imminentis* verò quartanæ signa sunt, si vel non nullæ vel plurimæ hæctenus enumeratæ causæ præcesserunt, sic ut



cum errore diætæ, nebulosi aëris constitutio, habitus corporis frigidior & similia sint conjuncta. *Adventantis jam & presentis* desumuntur i. ab *essentialiter inherentibus* & quidem. i. *horore & frigore prævio*, quæ hic majora quàm in ullâ aliâ febre & satis molesta, non secus ac in frigore intensissimo versantibus contingit, cum concussione totius corporis, stridore dentium, oscitatione & pandiculatione.

2. *Calore* totius p. n. communi febrium symptomate, qui hic respectivè non adeo urgens est, sed mitior quàm in tertianâ & fortior quàm in quotidianâ.

3. *Motus tempore*, ubi singulo quarto die inclusivè infestat malum quod hujus febris est signum pathognomonicum. Adde quod semper pomeridianis horis accidat paroxysmus, & decimam matutinam nunquam anticipet, de causa verò hujus temporis motus certant Autores, & ad huc sub judice lis est. Nos cum *Excellent. atque Experient. D. D. Wedelio*, statuimus, quod quaternis diebus moveatur, in causâ esse. i. materiæ peccantis copiam, quæ hic respectu aliarum intermittientium, minor est, quod patet ex remissiori calore in paroxysmo, & robore ægrotantium non penitus dejecto, hæc igitur tardius discussionem sui urget, & non adeò in vasis turgens minùs ad excernendum sollicitat naturam; non secus ac in defluxionibus catarrhalibus non semper, sed tunc demum cietur fluxus, cum tantum excrementi est collectum, quantum natura amplius tolerare nequit, vid. *MSS. Colleg. Excell. atque Experientiss. Dn. D. Wedelii, de febribus.* 2. materiæ peccantis dispositionem peculiarem, & ad naturalem motum ineptitudinem, quæ ab ejusdem crassitie & visciditate siccâ seu pro in coagulum abeunte, & frigidâ naturâ seu acidâ cruditate maximam partem dependet, & in aliis intermittientibus non occurrit.

3. Ipsius naturæ asvescentis alteram naturam; quæ dum aliquoties, invita licet, talem insultum sustinuit, tandem quasi asueta, statim temporibus, quicquid molestum est, excutit. Sicuti videmus illos qui cucurbitulis vel V.S. asveti sunt, si id intermittant, horum indicia sentire, & flagellatores papicolas, circa esuriales ferias paschales, ingentes dorsi pruritus sentire, si consuetam non servant methodum, me sæpius audivisse memini. Pomeridiano verò



verò tempore tantum infestat quartana, quia hæc febris magis serosa est, serosos autem morbos noctu acerbari notum est, & quia potissimum hybernis & autumnalibus diebus urget, ubi magis frigus nebulosum occupat aërem, quod poros obstipat, nativum obruit calorem, ipsumque ultrò invitat paroxysmum. Veteres ἰδιοτέρας humorum pro genuinâ hujus diversi temporis motus in intermittentibus causâ habent & melancholiam ordinariè quarto moveri die statuunt. *Willisus de febribus pag. 99.* pro causâ longioris intervalli in paroxysmis, habet aciditatē sanguinis, ad acredinem & caliditatem minùs inclinantem, quæ fucum alibilem (quem ille hic salvum putat,) sine luctâ & tumultu, utpote, non multum ab eo distantem, perverteret, quare ejus non nihil assimilaretur sensim, ut ejus congestio inde ad plenitudinem fieret tardiùs, & ita natura seriùs ad ejectionem à materiâ peccante incitaretur.

4. *Ex paroxysmi duratione*, quæ ob materiæ peccantis genium, plusquam in omnibus aliis febribus urget, & ordinariè ante duodecim horarum elapsum spatium non terminatur, quandoque etiam per viginti horas durat.

II. *Ex essentialiter consequentibus*, quartana varia stipant symptomata in facultate vitali, animali & naturali.

1. *In facultate naturali*, ubi appetitus quidem sæpiùs ad tempus durat, imò in principio quandoque, ob fermentum ventriculi acidius urget, in progressu tamen ob humorum accumulatorum copiam ἀνορεξία sequitur. Sitis minus quàm in tertianâ urget, magis quàm in quotidianâ.

2. *In facultate vitali*, ubi pulsus semper ferè est debilior, quàm in ullâ febre, ob chyli & sanguinis impeditam evascentiam, de quò vid. *Galenus libr. 2. de crisi cap. 3.* & licet in paroxysmo velox fiat & frequens, nihilominus & tunc propriam servat tarditatem respectivam, & non accedit ad velocitatem reliquarum intermittantium pulsus. *Crato Consil. 257.* palpitationem cordis conjunctam vidit, quam à flatibus deducit.

3. *In facultatis animalis actionibus* adest δυσσθένεια, & lassitudo spontanea, in recenti morbo paroxysmi admodum infesti ægros lecto affigunt, & totius depopulantur robur. Postea verò



leviori absolvuntur plagâ, ut accessiones ejusdem quasi ὁρμη-  
 γοι perferant. Dolor insuper dorsi juxta ductum thoracicum  
 quasi ostocopus est, qui cum rigore lumborum incipit potissi-  
 mum, & quandoque etiam hypochondriorum gravativus, ob co-  
 piam humorum vel tantum flatuum restagnantem ibidem, & a-  
 crimonia membranas vasorum vellicantem.

In *excretis & retentis* occurrit □na tenuis, pallida, clara,  
 ▽osa, potissimum in principio & extra paroxysmum, quia cras-  
 siores particulae ⊖æ & ▽stres, quæ aliàs s. n. hic excernendæ e-  
 rant, ob coctionem imperfectam, M. S. unitæ reservantur, quan-  
 doque tamen robore naturæ, vel adhibitis diureticis in paroxy-  
 smo & post coctionem humorum, talismodi ▽estreitates propel-  
 luntur & crassior evadit, & magis turbida. Alvus ut plurimum  
 mirâ pigritiâ vexat ægros, & loco fecum sæpissimè flatus egerit,  
 copiosos, qui cum ructibus & murmure ventris interpolantur,  
 tam antè, quàm in paroxysmo, tum ob calorem nativum ven-  
 triculi debilem, tum ob ⊕licam aciditatem ex pancreate, &  
 ventriculo promanantem, quæ naturalem figendo clysterem,  
 intestinorum fibras plus justo coarctat. Sudoribus insuper,  
 finito paroxysmo, ob feri copiam & calorem rarefacientem  
 diffluunt ægri, qui interdum foetent, ac indusia tingunt. π/υα-  
 λισμὸς quoque frequens hic occurrit, non minùs ab humidi-  
 tate superfluâ in ventriculo latitante ⊖atâ, & in fauces eleva-  
 tâ, quàm etiam à ductibus Stenonianis, variarum glandula-  
 rum parotidum, maxillarum & sublingualium oriunda, & in  
 os propulsa. In *qualitatibus mutatis*, cutis fit anserina, aures  
 labia & nares pallent, ζελκὸν faciei αὐθ ⊕ in lividum, plum-  
 beum & subatrum colorem versum est, pori constringuntur,  
 ungues livescunt, totum corpus non rarò subtumidum appa-  
 ret, ob restagnantes humores serosos, quandoque etiam ta-  
 bescit; diuturniori quandoque frigori expositi rubent, quia  
 ⊖ia à frigore partibus magis infigun-  
 tur.



## CAPUT VIII.

*De Signis prognosticis.*

**P**rognoseos exercitium sicuti non nascitur in cerebellis illorum, qui ultra vulgus non sapiunt, ita ejus accurata cognitio maximum famæ Medicæ spondet incrementum. Cujus cum & nos studiosi simus, prognosin nunc aggredi haud gravabimur. Quoad *salutis & mortis* igitur prædictionem, quæ ab *essentialiter in hærentibus* desumitur, notandum, quod magis metuenda sit diuturnitas quàm periculum, ratione enim *generis* hæc febris intermittens est, quas quocunque intermiserint modò, periculi expertes prædicat *Hippocrates sect. 7. aphorif. 62.* Idem *l. 1. de morbis vulg. comm. 3. text. 4. & libr. 6. epidem. tex. 7.* pro securissimo affectu quartanam habet; dum hæc laborantes magno quodam morbo non corripi statuit. Notandum tamen magnos morbos *Hippocrati* hic idem significare, quàm acutos, quos ob sulphur sanguinis oppressum, & exaltatas acidas  $\ominus$ inas fixas, in fluorem actas, & extra M. sanguineam hærentes, hic non metuendos esse, est quàm notissimum, & hinc natum est proverbium illud, noli timere quartanam, quia non facit sonare campanam. Nihilominus hæc etiam quosdam interiisse testantur autores, potissimum ætate perfectiores, & ubi remedia vel neglecta fuere, vel non ritè applicata. Sic *Wierus libr. observ. pag. 38.* agricolam, postquam triginta tribus annis quartana laborasset eadem interiisse meminit; Idem *eâdem pag.* de Nobili septimo anno, & parocho octavo quartanâ mortuum habet. Sin verò symptomatica evaserit, ut acuti præcedant morbi, & quartana superveniat, tunc hæc illos solvit. Propterea si superveniat convulsioni, ab eadem liberantur ægri, juxta *Sect. 5. aphorif. 70.* quatenus particulas acidas membranofum genus vellicantes aliorum secum rapit.

Minus periculosa est quartana ratione *essentie sue*, quia in hæc paroxysmi mitiori incalescentiâ defervent, quàm in tertianâ, ob humorem peccantem magis  $\ominus$ inum quàm  $\Delta$ reum, insuper ægri mediocriter robusti sunt, ipsisque duorum dierum spatium pro recollectione virium concessum est, hinc, si in duplicem vel triplicem mutatur, pejor est quartana.

Ratio-



*Ratione subjecti* cum focus mali extra M. Seam hæreat, tantæ molis res non esse videtur. Sin verò obstructio quædam contumax certi cujusdam visceris vel plurium & horum officium depravatum malum foveat, ut mesenterii, hepatis, lienis, pancreatis, tunc plerumque illorum sequitur genium, ut quò magis illa à statu naturali recedunt, eò vehementior quoque morbus sit, & contrà.

*Ratione symptomatum post essentialium* vehementior esse solet quartana, quæ cum dolore & duritie hypochondriorum, potissimum sinistri, purpurâ, maculis scorbuticis, ulceribus & crebrioribus conjuncta est flatibus, & contrà. Hi quippe dolores materiam acetosam & ream lieni vel hepati tunc firmitus impactam denotant. Similiter quæ cum hæmorrhagiâ narium conjuncta, juxta *aphorism. sect. 8.* pejor, quatenus fortius obstructa notat viscera. Sic cum hâc & singultu lethalem quartanam vidit *Hartmannus de febris pag. 888.*

*Ratione causarum* gravius decumbunt, qui ob hæreditariam dispositionem, res præternaturales prægressas vel concomitantes, ut scorbutum, affectum hypochondriacum, duritiem vel schirrum hypochondrii &c. quartana afficiuntur: periculosior quoque est, si à scabie retropulsâ recidivet, plus enim vice simplici unum subjectum quartanâ affici experientia testatur, licet contrarium statuunt *Hippocrates, Aetius lib. 5. cap. 8. & Verulamius.* Contrà minus subest periculum, si ob errorem diætæ, anni tempus, & cœli constitutionem quis hoc malum incurrat.

*Longitudinem & brevitatem* quod concernit, notandum, quod cancellis arctioribus complecti renuat, ut optimo jure chronici morbi veniat nomine, rarò enim vel nunquam ante tertium mensem terminari deprehenditur. Nihilominus sicuti seriùs medicina paratur, cum mala per longas invaluere moras; ita si principiis obviam imus, ubi materia peccans adhuc minus viscida est, medicusque simul & æger, & externa se exhibeant prompta, non rarò citius debellari posse malum non est improbabile. Contrà ad sextum mensem si perventum fuerit, ubi jam ipsi Mæ Sneæ labem affricavit, rarò ante annum terminatur. Quæ tamen Junio proximior, cum cerasa maturescunt, illa citius desinit. Quandoque etiam neglecta usque ad duodecimum extenditur annum, quem rarius excedit, & tunc ut plurimum affectum hypochondriacum aut scorbutum post se relinquit;

Alii



Alii quartanam quadraginta octo annos durasse notant. **Causam** durationis, & cur tam difficulter sanetur, communiter statuunt Autores atrabilariam sanguinis esse constitutionem, quæ nullis ferè cedat remediis. Nos pro genuinâ diuturnitatis causâ habemus fluorem & dominium  $\ominus$ linarum acidarum particularum in  $\Delta$ reas  $\circ$ las, & alkalinas  $\sim$ uosas depressas, quæ, uti ab initio in infimo ventre magis hærent; ita successu temporis toti M. Sex non possunt non communicari, similemque diathesin eidem inducere; quæ postmodum tota  $\pi\nu\epsilon\upsilon\mu\alpha\tau\acute{\alpha}\sigma\epsilon\iota$  destituta tam difficulter volatilifari potest, non secus ac etiamnum hodie in aceto vini restitutio partium  $\sim$ uosarum &  $\Delta$ rearum non facilis, nec nisi singulari artificio possibilis est, quod  $\sim$ us hñi ardens demonstrat; neque enim immutatio miranda particularum negari potest, tum in liquidis tum in humidis, per  $\epsilon\gamma\chi\epsilon\iota\sigma\iota\sigma\iota\nu$  chemicam exemplo esse potest  $\text{g}$ ium diaphoreticum, ex quò per  $\Delta$ em fusorium  $\text{W}$ us iterum comparatur, quem totum jam antea exhalasse quis putare posset. Vid. *Excellentiss. Wedel. tract. de facultatibus medicament. pag. 137.* accedit adhæc ipse materiæ peccantis genius, qui potestate fermentativâ, & multiplicativâ admodum pollet, ipsaque medicamenta potius in suam naturam fermentare aptus natus est, quàm ut ipsis obsecundet, non tamen eundem servat tenorem.

Sic *ratione temporis anni* juxta Hippocrat. *Sect. 2. Aphoris. 25.* æstivæ plerumque breves, autumnales verò longæ sunt ob transpirationem prohibitam, & maximè quæ ad hyemem pertingunt. Quando verò solstitium vel æquinoctium imminet, ut post Luciae diem, vel festum Gregorii, plerumque spontè solvuntur, magis tamen solstitio æstivò. *Luis Aeneas Caprius de febris putrid. in spec. lib. 2. pag. 210.* plures quartanas curatas observavit unius mensis spatio, omnes verò ferè circa solstitium hyemale. Ab errore quoque diætæ ortas brevissimas esse asserunt, alii, & post sextum paroxysmum terminasse notârunt.

*Ratione symptomatum* citiùs quoque quartanis defungi illos, quibus ab initio morbi appetitus est dejectus asserit *Schenckius observ. med. lib. 6. observ. 44. pag. 498.* contrà, quibus ab initio morbi idem salvus manet, diutius iisdem laborare. *Ratione ætatis* infantes & juvenes citius liberantur, ob  $\sim$ us copiosos, & dulces sanguinis balsamicas partes, quæ obstructionibus minus obnoxia sunt, ab acidisque



minùs subjugari possunt. Viri respectu priorum, quia jam acrioribus gaudent humoribus, & sanguine, graviùs decumbunt, & tardius liberantur. Senes omnium difficillimè liberantur, ob naturæ robur depauperatum, & sanguinem acescentes, lympham stagnantem, & poros viscerum subsidentes. Quocirca in his non raro *συμπεπνυγμεν*, nihilominus *Wierus libro observationum pag. 40.* sexagenarios hâc curatos notat, quod potissimum in illis succedit, qui in senio adhuc vegetiores sunt.

Ratione *excretorum*, brevior est, quæ jam crassam conjunctam habet quàm tenuem. Quia illa humorum coctionem denotat, & peccantem materiam eliminat.

Ratione *qualitatum mutatarum*, si frigori expositi intenses rubeant, ob copiosas particulas & tunc partibus magis infixas, periculosius laborant.

*Modus eventus* denique fit vel ad salutem, tùm perfectè, ubi natura vel sponte vel pharmacis adjuncta, morbificam materiam criticum in morem, è corpore eliminat, modò per vomitus, modò per sudores, urinas nigricantes, menstrua & hæmorrhoides, licet hæc non educant sanguinem melancholicum ex liene, juxta veteres, interdum etiam per abscessus & pustulas lividas in cruribus; per dysenteriam, sed rariùs, quæ lienosis proficua est, juxta *aphoris. 48. sect. 6.* qualem ex hieræ picræ usu cum fructu notavit *Schenckius libr. 6. obs. 42.* rarò tamen discedit, ut non inurat maculam corpori, vel sui relinquat memoriam, tùm imperfectè, ubi in alium morbum mitiorem per metaptosin terminatur, sic à scabiè superveniente solvitur febris quandoq;, quia tunc materia peccans ad exteriora fertur, quandoque hâc finitâ, in junioribus crescunt corpora in magnam molem & interdum non eâdem proportionem & tenore; sed improporionatè, debilia, & quandoque ridicula evadunt, quale *Julius Cesar Scaliger pag. 46.* Wiero dicitur *Mediolani* vidisse in juvene, qui ob proceritatem stare non potuit, sed in duobus lectis simul junctis cubare coactus fuit.

Similiter *Wierus in obs. pag. 41.* vîrginem ex quartanâ gygantem factam notavit, quam historiam etiam *Schenckius lib. 6. obs. 41.* recenset, ratio videtur esse, quia partes durante febre naturali



rali nutritio succo privatae erant, quò restitutò sitibunda illum absorbent, ut hæcenus perpeßum restaurent damnum.

*Ad mortem* comitatur ægros, si cum gravioribus viscerum obstructionibus extet, vel in alium graviozem mutatur morbum, sic in hypochondriacum affectum, & scorbutum interdum abit, quorum tamen progenies quandoque etiam est, vid. *commentar. Deckeri ad praxin Barbetianam pag. 144.* & in hydropem abiisse, *Ebnßina canonis lib. 4. sect. 1. tract. cap. 62.* meminit.

## CAPUT IX.

### *Methodus medendi, ex fonte Chirurgico.*

**T**heoriam nunc sequitur praxis, quæ *methodo therapeuticâ* & præsidiorum materiis absolvitur. *Methodus therapeuticâ* niti-  
tur indicatione *curatoriâ, præservatoriâ* & *vitali*.

Indicatio curatoria ipsum morbum & ejus causam immed-  
diatam eliminat, naturam benè agentem in opere suo adjuvat, &  
quid ejus sit officii monet, humoresque peccantes ad naturalem  
reducit statum.

Præservatoria remotiores causas respicit & ne in actum de-  
ducantur, vel profligatæ reddantur sibi, novasque vires sumant,  
omnem movet lapidem.

Vitalis, non tantum subjecti causæ, sed & totius vires &  
tonum respicit illasque tum præsentis, per alimenta laudabilis  
succis conservat integras, tum oppressos & depauperatos per me-  
dicamenta convenientia restaurat efficaciter.

*Symptomatibus* urgentibus quoque auxiliatrices affert ma-  
nus, ne ab his irruentibus natura nimis debilitata succumbat ex  
improviso. *Præsidiorum materiæ* ex famosis fontibus, *chirurgico,*  
*pharmaceutico* & *dietetico* sumuntur.

Ex fonte *chirurgico*, primum se offert V.S. quæ, an conveniat in  
nostro affectu, magni momèti quæstio est. Licet enim generosum



fit remedium & duro nodo durus cuneus querendus; tamen non tam illud adducemus, quod nonnullis visum est molliter in principio quartanam esse tractandam, & si potissimum in principio, fortioribus eidem obviam eamus, deteriore eandem fieri, & ordinariam omnem postrespuere curam, neq; enim blandiri decet morbo sed quanto citius eum averruncare; quam quod indicantia tanti sint momenti ut illam fieri imperent. Cum enim non in ipsis sanguinis undis malum hæreat, sed tantum per vices in illas mittatur; hinc facile patet ejusdem usum hic minus esse commodum Vid. *Disp. de V.S. Excell. atque Experientiss. Dn. D. Wedelii cap. 3.* Insuper ab eadem metuendum, ne balsamum vitæ jam antea ab acido suppressum magis depauperetur. Sicuti in omnibus intermittentibus superfluum ferè opus est ejus usus; ita maximè in quartanâ, ob sanguinis coalescentiam imminutam, facile duplicare, vel triplicare potest febrem; quatenus *Areo-* alkaline particulæ magis imminutæ, minus acidis dominium expetentibus resistere possunt. Unde ab hujus adhibitione intempestivâ plus vice simplici cachexiam & ipsam hydropem autores annotârunt, vid. *Colleg. Privat. Excellent. atque Experientiss. Dn. D. Wedelii*, ex quo, tanquam Præceptoris mei venerandi assertis, plurimum me hausisse lubens fateor, idem *Riverius Cent. 3. obs. 70. pag. 625.* Citra plethoræ igitur præsentiam, vel urgentia quædam alia symptomata συνεδεύοντες, non facile aperiantur vasa. Quod verò decantatam salvatellæ sectionem attinet, quam *Riolanus in Enchiridio Anatomico*, item *Galenus de curandi ratione ad Glauconem cap. 11.* & *Spigelius libro 5. de humani corporis fabrica cap. 7.* & alii magnificiunt & experientiam allegant, id cum grano salis est intelligendum. In totum tamen eam non rejicimus, sed in diuturniori malo, postquam sanguinis massa jam toties incanduit, potius suademus ut instituat V.S. præcipuè si suppressa fuerit aliqua consueta sanguinis evacuatio, mensium v.g. vel hæmorrhoidum; & si forsan, sub causarum agmine contenta, huic malo ansam dederit. Ibi enim ferosi humores plerumque copiosè stagnant in toto corpore, qui cum modicâ sanguinis quantitate aptissimè evacuari possunt; Tempus administrationis igitur ordinarium non sit statim ab initio morbi, sed ad minimum post trium vel quatuor mensium elapsum



elapsum, ubi corpus antea benè purgatum, & humores peccantes maximam partem evacuati fuerint; aliàs enim quicquid in infimo ventre stagnat vitii, facile intra vasa absorbetur, & malum potius augetur. Ubi verò statim unà cum suppressione consuetarum sanguinis evacuationum ingruit malum, ibi etiam extraordinariè accelerari potest ejus usus, & statim, postquam primæ viæ leniter abstersæ sunt, institui. Ratione paroxysmi sit dies intermissionis, afflicto enim non est addenda afflictio, quæ aliàs magis debilitaret ægrum. *Locum* quod concernit, facile fuerit ex dictis circumstantiis id æstimare prout, vel evacuatio simplex, vel revulsoria aliaque simul indicatur, in genere verò salvatellæ primatum deferre non possumus si veterum sensu sympathiam peculiarem cum corde ipsi quis arroget, quæ cum hodiè ab omnibus cordationibus rejiciatur, merito alii judicamen inde arcessunt, quod in extimis partibus manibus & pedibus sanguis magis lutosus restagnet, unde & in pedibus salubriter administratam decantant. Alii salvatellæ sectionem plus levaminis afferre putant, quàm aliarum venarum, quia ex illâ, ob arteriarum viciniam & synanastomosis sanguis magis tuosus eliceretur, ut etiam *Antonius van Der Linden* observaverit ex eadem cum saltu prorupisse. Sufficiat nobis consultius aperiri *minora vasa*, cum evacuatio debeat esse parcior; Sin ab obstructione mensium, vel hæmorrhoidum ortum sit malum, vel cum his conjunctum, *saphenæ* sectio erit convenientissima, quia horum aperit obstructions. Aliàs, ubi finis est universalis evacuatio, non adeò curiosè attendendus est minorum venarum selectus. *Quantitas*, cum è minoribus vasis certò mensurari nequeat, sit parcior, quàm in aliis horum apertionibus. Illo enim generali præcepto, in minorum venarum apertione, ubi tam diu fluere sinunt sanguinem, donec spontè desinat, vix assentiri possumus. Consuli etiam in hoc potest emissæ sanguinis color, qui, quò magis ad nigredinem vergit, eò minor educatur quantitas, & contrà.

Vicariæ aliàs venæsectionis *cucurbitulæ* vel parùm proficuæ, vel minùs usitatæ hîc videntur. *Hæmorrhoidum* clausarum apertio pari passu cum V.Sne in usu ambulat, adde naturam per illa loca non rarò crassiores particulas, & acidas, licet in fieri tales, evacuare. Modus



aperitionis per hircudines cum fyringe admissas est tutissimus. Coe-  
 eas verò, quæ nunquam fluxerunt, aperiendas non suademus. *Fric-  
 tiones* dorfi, potissimum cum linteaminibus calidis non sunt de nihilo,  
 hæ enim aperiunt poros, & exhalationi humorum peccantium vias  
 parant, Areasque excitando particulas sui easdem commonefaciunt  
 officii. *Vesicatoria & Fonticuli* in usum quoque trahi possunt, si  
 forsan à restagnatione humorum, in diuturniori malo totum corpus  
 intumuerit, & ad hydropem inclinare visum sit, sunt enim seriduca  
 maximè generosa, fontem tamen mali non attingunt.

## CAPUT X.

### *De fonte pharmaceutico.*

**I**N hoc uti certiora, pro debellando nostro affectu, se se suggerunt  
 auxilia; ita prima cura sit, ut materia morbigica, in primis viis hæ-  
 rens, sensim evacuetur, quæ cum stagnationi assueta, minùs mobilis  
 sit, fortiorum purgantium ab initiò adhibitorum, indubiè ludit ope-  
 ram, malè enim illi consulunt ægris, qui, quo pingvior est alvus, eò ge-  
 nerosiora propinant purgantia. Præmittenda sunt *Lenientia*, hæc  
 quippe viscedinem humorum & mucum blandè abstergendo, diver-  
 tent ad inferiora; observatumque indè est, non expeditis primis viis,  
 infarctus vasorum & glandularum intestinalium fuisse adauctos, eo-  
 que promptius conspurcari distribuendum in illum, culinâ chylosum  
 succum, quæ in formâ humidâ hic erunt convenientissima, & sequen-  
 tia esse possunt:

℞. Rad. s. aperient. major. ā. 3℔. rhabarb. Alexandr. 3ij.  
 herbe betonice, scordii ā mj. fol. senæ s. st. 3℔. flor. bor-  
 rag. bugloss. ā pj. summitatum fumar. m℔. costi veri  
 3ij. cremoris ʒi 3℔, manne foliatæ 3ij. Concis. contus. in  
 funde in feri lactis caprini ℔ij. l. q. s. pro una dosi sumantur ʒiij

℞. Decocti florum & fructuum ʒiij. essent. fumar. compos. 3ij.  
 Ræ florum quatuor cordial. ʒis pomatæ ā 3℔. extracti  
 Rhabarb. 3j. sirupi rosar. de polypod. ā 3℔. M. F.  
 Haustus S. Laxir-Transc auff 1. mahl.

℞. Rad. belenii, cichorii ā ʒiij. mechoacanna alb. 3j. her-  
 ba



*be hepat. nobil. cuscute* ā m<sup>j</sup>. *flor. rosarum, summitat. absinth.*  
 ā p<sup>j</sup>. *agarici trochiscati* 3j. *cortic. aurant.* 3ß. *passul.*  
*minor.* 3vj. *spic. Indic.* 3j. *Misce concis. contus. g. m. coque*  
*in f. q. ☐ & f. Colature* R<sup>x</sup>. 3iij. *adde sirupi de cichorio cum*  
*Rhabarb.* 3j. S. *Lindtrancē* auff 1. mahl.

*Preparantia*, chemicis communiter *digestiva* dicta, hīc maximè inveniunt locum, quàm rebellis enim sit materia febrilis, in hāc nostrā qvartanā, abundè loquitur experientia. Hāc scil. διαχόρσιν humorum crudorum respiciunt, & tam necessariam in his affectibus coctionem earundem procurant, in quā curationis maximum pondus situm esse unanimiter affirmant medici. Nos exempli loco sequentia commendamus.

R<sup>x</sup>. *decocti aperitiv.* 3iij. *us aperitiv. Penoti* 3ij. R<sup>e</sup> 3ii *fatē*  
 3j. *sirup. conservat. Zingib.* 3ß. M. F. haustus S. *Digestivē*  
*Trancē.*

R<sup>x</sup>. R<sup>e</sup> 3is *pomat.* 3iij. *arcan.* 3ri 3ij. M. D. in vitro  
 S. *Digestiv Mixture* 35. *Tropffen* auff 1. mahl.

R<sup>x</sup>. *Rad. s. aperientium minorum* ā 3ß. *polypod.* 3ß. *rhabarb.* 3ij. *herb. cuscut. asplenii, capill.* 3ris ā mß. *flor. rosar. violar. centaur. minor.* ā p<sup>j</sup>. *corticum capparum* 3ß. *limat. 3is magnesiata* 3ß. *3is absinth. centaur. minor* ā 3ß. M. concis. contus. g. m. d. in syndonē S. *Species zum Wein.*

R<sup>x</sup>. R<sup>e</sup> 3ri 3ij. *essent. 3is liquide* 3ij. M. D. in vitro S. *Digestiv Essentz* 25. *gutt.* auff 1 mahl.

R<sup>x</sup>. *Croci 3is aperitivi cum 3ibus gr. xv. crem.* 3ri. gr. iij. *magist. corallor.* 3ß. M. D. in charta, S. *Digestiv.* auff 1. mahl.

His ritè præmissis, humoribusque peccantibus ad exitum sufficienter dispositis, subdenda sunt.

*Purgantia*, quæ hīc non nimis activa esse debent, nec prius adhibenda sunt, quàm cum pituita jam est educta, & semper cum confortantibus aromaticis, quæ, quod fixum est, exaltant & volatilifant, miscenda, aliàs ventriculi tonus, cujus ratio hic maximè est habenda, magis deicitur, aërosis chyli imminuitur, vires attenuantur morbusque prolongatur.

R<sup>x</sup>. *Julepi violarum* 3iij. *electuar. lenitiv.* 3j. *extracti bellebori nigri*



*nigri, panchymagog. Crolli ā. gr. xv, specier. aromaticar. ro-  
sat. ℞ sirup. de pomis ꝑ℞. M. F. l. a. haustus purgans.*

℞. *Rhabar. Alexand. ℥iij. fibrar. hellebor. nigr. ℥ij. fol. senæ s. st.  
ꝑ℞. Summitat. fumar. absinth. gratiol. ā. mß. sem. 4. calid.  
major. ā. ℞j. Crystallor. ꝑri ℞iv. M. Concis. contus. g. m.  
D. ad chartam, S. Species zum purgirenden Kräuter Bier.*

℞. *Pulv. laxativ. vegetab. Rolf. diasenæ Montagnan. ā. ℞j. magist.  
scammon. galapp. ā. gr. iv. ꝑri Olat. ℞ß. o. anis. gtt. ij.  
M. F. Pulvis D. in chartâ, auff 2. mahl.*

Hâc pertinet febrifugum *Riverii*, quod describitur *Centuria 3.  
observ. pag. 634.* item pulvis purgans *Paracelsi*.

℞. *M. ꝑrear. Quercet. gr. xv. extracti ꝑis purgantis, helle-  
bor. nigr. gr. iv. trochisc. alhandal gr. iij. elixir. prop. parum  
M. F. l. a. pilulæ. S. Purgier Pillen auff 2. mahl.*

℞. *Conservæ borrag. pulpa passular. ā. ℥ij. rhabar. pulverisat. ℞j.  
magister. scammonii gr. v. sirup. rosar. solutiv. q. s. o. ma-  
cis gtt. ij. M. F. l. a. bolus purgans.*

℞. *Rad. glycyrrhizæ, polypod. ā. ℥ij. fibrar. helleb. nigr. ℥iij.  
myrobalan. omn. ā. ℥ij. Sem. anis. fœnicul. ā. ℞j. coque c. f.  
q. ▽. simpl. ad zias, adde sirupi sceletyrbici *Forest.* fol.  
senn. ā. ꝑ℞. S. Purgier Trancf auff etlichemahl.*

Cum verò humores ex errore diætæ, in ventriculo collecti, ob  
visciditatem suam ponticam, stomachi plicis non rarò tam fir-  
miter inhæreant, ut omnem purgantium ludant operam; ideò non  
rarò unicè recurrendum est ad

*Vomitoria*, quæ quasi vectibus expellunt malum, & ipsam  
radicem extirpant quæ tamen interdum etiam statim post alte-  
rantia & præparantia propinata, ubi morbus nondum radices e-  
git, opem ferunt. Non verò promiscuè in consuetis, sed magis  
*Cepêtois* propinanda sunt, nec semper his solis insistendum,  
sed cum aliis interpolanda sunt, & maximè ante paroxysmum  
danda.

℞. *ꝑri emetici gr. iij. eleosacchari cinamomi gr. iv. M. F. Pulvis  
auff einmahl.*

℞. *ꝑii vitæ gr. ij. rad. asar. ppt. ℞i. l. gr. xv. o. macis gtt. j.  
M. S. ut suprâ.*

℞.



R $\mathfrak{x}$ . magister. g. g. gr. v.  $\Theta$  is  $\Theta$  li  $\mathfrak{B}$ .  $\mathfrak{S}$ . anis. gti, S. ut supra.

R $\mathfrak{x}$ . vitri  $\frac{1}{2}$ ij, vel croci metallor. puri  $\mathfrak{B}$ . vel gr. V. infunde per  
 $\rho$  in vini generosi  $\frac{3}{4}$ ij. colaturæ adde  $\nabla$ . cinamom.  $\frac{3}{4}$ ij. M.

Fiat haustus. Infusa quippe  $\frac{1}{2}$ iata multi hic magni faciunt.

R $\mathfrak{x}$ . fol. asari n. viij. infunde in vini boni  $\frac{3}{4}$ ij. colaturæ adde si-  
 rupi emetici Salæ  $\frac{3}{4}$ ℞.  $\mathfrak{A}$  is  $\odot$  ati  $\frac{1}{2}$ ij gr. iij. M. F. haustus.

Clysteres quoque non erunt de nihilo, potissimum si dolores  
 intestinorum & tormina ventris initio paroxysmorum simul ur-  
 gent. Hi enim intestina elutriant illorumque obstructiones re-  
 ferant, nec uti purgantia debilem affligunt ventriculum. Hinc  
 his solis se quartanam curasse gloriatur Crato consil. med. 254. pag.  
 770. notandum verò quod in his emollientia sint convenientissi-  
 ma, quibus carminativa optime maritantur.

R $\mathfrak{x}$ . Rad. lil. albor. asparag. fœnicul.  $\bar{a}$ .  $\frac{3}{4}$ ℞. berbar. s. emollient.  
 fumar.  $\bar{a}$ . m $\mathfrak{j}$ . flor. chamom. Roman. lil. albor. summitat.  
 centaur. minor.  $\bar{a}$ . m $\mathfrak{B}$ . Sem. fœn. graci, carvi, anis.  $\bar{a}$ .  $\frac{3}{4}$ ℞. a-  
 garici in petiâ legati  $\frac{3}{4}$ ij. coque in s. q.  $\nabla$ . s. colatur.

R $\mathfrak{x}$ .  $\frac{3}{4}$ x. adde  $\mathfrak{S}$ o rutæ, capparum  $\bar{a}$ .  $\frac{3}{4}$ ℞. electuar. lenitiv. Bur-  
 bi  $\frac{3}{4}$ j.  $\Theta$  is  $\mathfrak{F}$  ri  $\frac{3}{4}$ j. vitell. ovor. num. ij. M. F. l. a. Clyster.

Cum ex supra dictis notum sit quartanam esse serosam febrim,  
 & non rarò totum corpus subtumefacere, & ad ipsum hydro-  
 pem disponere, ideò nulli dubitamus, quod Diuretica hâc labo-  
 rantibus solatio sint futura. Hæc enim serosam colluviem sen-  
 sibiliter evacuant, magnamque partem crassorum feculentorum  
 humorum simul abducunt. Talia verò sunt sequentia.

R $\mathfrak{x}$ .  $\Theta$  is absinth. cardui bened. cent. minor.  $\bar{a}$ .  $\mathfrak{B}$ . magister. co-  
 rallor.  $\frac{3}{4}$ j. elæosacch. succini gr. vj. M. F. pulvis D. in chaitâ,  
 S. Harntreibendes Pulver auff 2. mahl.

R $\mathfrak{x}$ . Ræ  $\mathfrak{F}$  ri  $\frac{3}{4}$ ij. essent. succini  $\frac{3}{4}$ j. M. S. Harntreibende Essent $\mathfrak{z}$ /  $\frac{1}{2}$   
 25. Tropffen auff 1 mahl.

R $\mathfrak{x}$ .  $\ominus$  us  $\Theta$  is  $\frac{3}{4}$ ij. Ræ violarum  $\frac{3}{4}$ ij. M. S. ut supra.

R $\mathfrak{x}$ .  $\nabla$  æ saxifrag. ononid. petrosel.  $\bar{a}$ .  $\frac{3}{4}$ ij. clyssi  $\frac{1}{2}$ ij  $\frac{3}{4}$ j. sirup. de  
 fumar.  $\frac{3}{4}$ j. M. F. Potio auff 2. mahl.

Cum per sudores non minùs ac ipsas  $\square$ nas, multum ma-  
 teriæ  $\mathfrak{F}$  reæ evacuari, ipsumque sanguinis circulum potenter re-  
 stitui certum sit; Ideò Sudorifera hîc subnectere haud gravabi-  
 mur.



Notandum verò de illis, ne sint nimis volatilia, & indefinenter ante evacuantia reliqua adhibita. Quia hōc modō serum, idque magis volatile, nimium absumitur, & inæque particulæ magis partibus infiguntur. Sic memini ab *Excell. atque Experimentiss. Dn. D. Wedelio* me audivisse, quod studiosus quidam, qui quartanâ laboraverat, sudoriferis nimium à medico excruciat, in purpuram scorbuticam, multis annis post durantem, incidere, ad habitum corporis nimis importunè detrufis & excandefactis humoribus serosis & & inis. Quo circa nos eadem cum reliquis medicamentis interpolanda putamus, nec solis volatilibus insistemus, sed media & fixiora si non semper illis præferemus, tamen maritabimus.

Rx. *Essent. fumar.* ℥iij. *mus fuligin.* ℥j. M. S. ut supra.

Rx. *Æ cardui bened. centaur. minor.* ān. ℥j. *Mixt. simpl.* ℥j. *sirup. de canella q. s. ad gratiam.* M. F. haustus.

Rx. *℥ii. diaphoret. & is fumar. tamarisc. fraxin. conchar. preparat.* ā ℥j. *flor. & is \*ci & ial.* ℥℔. *℥i caryophyll. gtt. iij.* M. F. Pulvis auff 4. mahl

Rx. *rob. sambuc.* ℥j. *theriac. C. C. phil. prop.* ā ℥j. *extract. centaur. minor. absinth.* ā ℥℔. *sacchar. q. s.* M. F. l. a. Bolus.

Rx. *bezoard. & is, eboris s. Δe, arcan. duplicat. Myns.* ā ℥℔. M. F. Pulvis auff 2. mahl.

Fontem pharmaceuticum claudunt *alterantia*, *specifica* & *confortantia*, quæ partim immediatè opposita sunt nostro affectui, partim visceribus laborantibus, & potissimum ventriculo, mesenterio, lieni & pancreati suppetias ferunt, ipsorumque tonum laxatum restituant, obstructaque vasa recludunt; exhibeantur verò ante paroxysmum, ter vel quater continuando statò ejusdem tempore, licet emanet febris.

Rx. *decocti contra quart.* *Quercetani* ℥iiij. *mus antiquart. D. Michaelis* ℥℔. *essent. fl. bellidis* ℥j. *Rælap. lazuli* ℥ij. *extr. chamædr. calami aromat.* ā. ℥℔. *sirup. de fumar.* ℥j. M. F. l. a. Potio auff 2. mahl.

Rx. *Rad. acetos. caryophyllat.* āā. ℥℔. *herb. thee miß. lingue cervin. mß. flor. 4. cordial. hepat. nob.* ā. p. i. *granor. coffi* ℥ij. *sandal. citrin. cortic. aurant. cappar.* ā. ℥j. M. concis. con-



tuſ. g. m. coque in  $\nabla$ æ card. bened. & vini  $\bar{a}$ . q. ſ. in MB. co-  
laturæ adde Spec. diatrion ſantalorum q. ſ. S. Alteritranck  
auff eckliche mahl.

Huc etiam pertinet  $\nabla$ a ſcorbutica Sennert. polychreſta  
Rolfinc. decoctum oculor.  $\mathcal{S}$  clinopodii Mathioli, raparum, quod  
Crato conſil. pag. 769. pro ſpecifico habet, & hoc ſolum per multos  
dies etiam 15. exhibet ante paroxyſmum in vino, modum parandi vide  
ibid. pag. ſeqv.

Rx. Rad. helenii imperat.  $\bar{a}$ . 3ij. herba chamædrios, chamæpit. car-  
dui bened.  $\bar{a}$ . mj. plantag. centaur. minor. ſummitat. fu-  
mar.  $\bar{a}$  mß. flor. 4. cordial.  $\bar{a}$ . p. j. cortic. citri 3j. china china  
3ij. granor. piper.  $\mathcal{S}$ j. cardamom. 3ß. limatur  $\mathcal{S}$ is 3ß. oculor.  
 $\mathcal{S}$  3ij. Cryſtallorum  $\mathcal{F}$ ri  $\mathcal{S}$ iv. concif. contuſ. g. m. D. in ſyn-  
done S. Species zum Wein.

Rx. Elixir PP. albi Helmont. 3iiij.  $\sim$ us  $\mathcal{S}$ is ammoniac. 3ß. M. S.  
Siberz Eſſent 30. gtt. auff 1. mahl.

Rx. Eſſent.  $\mathcal{S}$ is abſinth. 3iiij Ræ corallor. 3j. M. D. in vitro S. ut  
ſuprà.

Rx. Elix. anthypochondriac. 3iiij. eſſent. Myrrhæ baſam. 3j. M.  
S. 40. gtt. auff 1. mahl. D. cum vino.

Rx. Elixirii febrilis 3ij.  $\sim$ us antiqvart. 3ß. M. D. S. 25. gtt. auff 1.  
mahl.

Rx. Corticis Peruvian. 3j.  $\odot$  fulminant. gr. vi.  $\odot$ . caryophill. gtt. ij.  
M. F. pulvis auff 2. mahl.

Rx. Pulv. antiqvart. Excell. Dn. D. Wedelii 3j.  $\mathcal{S}$  febrilis Mynſ.  
3ß. M. F. pulvis.

Rx. Trageæ ſtomachal. Qvercet an. 3ß. fecula ari  $\mathcal{S}$ j. croci  $\mathcal{S}$ is ſac-  
charin. gr. viii.  $\odot$  antifebril. Excell. Dn. D. Wedelii gtt. iv.  
M. F. pulv. auff 2. mahl S. öſſnend Pulver.

Rx. Croci  $\mathcal{S}$ is aperitiv 3ß. magiſter. ocul.  $\mathcal{S}$ . coralliorum  $\bar{a}$   $\mathcal{S}$ j  
 $\odot$ li  $\mathcal{S}$ is gr. iii.  $\odot$  piperis gtt. ij. M. S. ut ſuprà.

Huc etiam pertinet pulvis abſorbens Excell. Dn. D. Wedelii qui  
inſtar omnium jam dictorum eſſe poteſt, &  $\odot$  omnia carminativa &  
ſtomachica, cum  $\sim$ ibus pulveribus miſta, quæ quandoq; ſine vomito-  
riis febrim tollunt, & hîc audacius, quam in aliis intermittentibus ex-  
hiberi poſſunt, cum ob materiæ peccantis genium, aciditatem puta,  
in continuam non facilè abeat quartana.

Rx. ſpe-



Rx. *specier aromat. rosat. Gabr.* ʒj. *diarrhed. Abbat.* ʒij. *rad. helen.* condit. *trochisc. de capparibus* ʒij. *ebor. sine Δ par.* *Croci* ʒis *aperitiv. cum* ʒibus ā ʒj. *margarit. ppt. corallor. rubror.* ā ʒß. *cinamom.* ʒj. *Sacch. Canariens.* ʒß. *in s. q. Væ rosar. soluti f. l. a. morsuli,* S. *Stärck. Morsellen.*

Rx. *Conserv. borragin. bugloss. meliss.* āā ʒj. *cortic. aurant. citri* condit. ā ʒß. *Zinziber. in Ind. condit.* ʒij. *spec. de gemmis frigid. aromat. rosatar.* āā ʒiß. *latif. Galen.* ʒß. *Confect. al-kermes* ʒij. *sirup. borrag. bugloss.* āā. q. s. M. F. l. a. *Electuarium* S. *Stärck. Zucker/* dosis sit quantitas nucis juglandis.

*Topica tandem sicuti internis postponenda, ita nihilominus laborantibus partibus strenuè succurrunt. Licet enim quandoque nullum urgens symptoma horum usum requirere videatur, nunquam tamen hæc negligenda esse rectissimè monet Crato in consil. 256. pag. 770. qui in arcanis habet, si accuratè observetur, quænam corporis pars in ipsâ invasione laboret, vel doleat, illaque ante evacuationem humorum diligenter foveatur; quomodo empiricum consummatum quartanarium curasse meminit. Quocirca ne vel in hoc nostris deesse videamur ægris, ideòque his quoque paululùm immorabimur. Præsupponimus verò semper interna præmittenda esse, ut si magis ventriculus sit affectus, ex præmissis propinentur prius magis aromatica cum acidulis mista; sin. hepar, vel lien, magis aperientia cum aromaticis & acidis misceantur, & postea sequentia ordinentur.*

Rx. *panis melliti* ʒiß. *pulv. menth. marrub. galang. zedoar.* ā. ʒj. *tacamahaca, mastich. N. M. caryophyll.* ā ʒij. M. subigantur cum V s. q. F. l. a. *cataplasma,* S. *Magen-Umschlag.*

Quò & pertinet emplastrum de crustâ panis, cerotum stomachale, emplastrum stomachale *Galen.* *Cratonis* cum ʘ menth. &c. *spec. aromat. rosat. sacculi ex pane tosto, cum aromat: & vino,* ʘ, stomachic. V solus &c.

Lieni insuper præ reliquis est prospiciendum, hujus enim affectio quartanæ curationem difficiliorem reddit, & plerumque cum quartanâ est conjuncta, licet quandoque in ejus regione acutum non persentiscant dolorem ægri.

Rx. *ungvent. splenet. Senn. dialthea* ā. ʒß. ʘ *cappar.* ʒß. *laterin.* ʒß. *suc-*



*succiruta* ℥℞. *galban. aceto scyllitic. solut. inspissati* ʒj. M. F. unguentum S. *Milk-Eäblein*.

Aliud etiam habet *Crato consil. 249. pag. 77.* Emplastra quoque non erunt de nihilo, tanti enim à nonnullis æstimantur, ut his quoque solis quartanam curari posse asserant, vid. *Helmontius*.

Rx. *Ceroti de ammoniaco Forest. ʒj. o capparum q. f. ♀ rectificati Myns. ā* ℞. M. Extendatur super alutam in formâ semilunari. S. *Milk-Pflaster*.

Quò & pertinet emplastrum ex tabaco *Hoffmanni in thesauro pharmaceutico pag. 66. & de cicutâ, pag. antecedente*, item emplastrum magneticum *Sala*, bdellium, styrax, calamita, ladanum, asa dulcis, olibanum, & ex his composita.

Tacemus alia hepatica, aliundè ex suis fontibus mutuanda, quale etiam sequens esse potest.

Rx. *emplastri santalin. ʒj. o cappar. chamamel. Rom. ā. q. f. o lign. sanct. ℞. M. F. l. a.* emplastrum, extendatur in alutâ cum syndone rubrâ, formâ rotundâ, conspergatur *pulv. santal. rubr.* S. *Leber-Pflaster*.

Rx. *Ųæ taraxaconis vermicularis āā ʒiiij. aceti rosati ʒj. spec. pro epith. hepat. diarrhod. abb. ā. ʒij. M.* applicentur calidè.

Hæc etiam spinæ dorsi applicari possunt, si rigor urgeat; ibi enim fomenta & inunctiones probatæ sunt.

Si sudores nimis molesti urgent, & debilitant vires, commendant nonnulli o um olivarum & nymph. cum lacte mulieris, quæ filium peperit ā. ʒj. quod ultimum tamen ut supersticiosum rejicimus. Pulsibus & articulis applicari potest rad. urticæ contusa & aceto macerata, ut & sequens.

Rx. *theriacæ ℞ij. vermium dipsaci, tel. araneæ. ā. ℞j. concis. contus. subigantur cum aceti parum M. F. l. a.* Cataplasma.

Huc etiam pertinet salivatio ꝑialis, quâ per duodecim dies institutâ, *Willisius de febribus pag. 102.* virginem Illustrem se curasse gloriatur; quæ ideò officium facere videtur, quia serum viscidum liquat & evacuat.

Non immorabimur hōc locō in specificorum variorum recensione, quæ quidem promissis non æque respondent semper, sæpè tamen



comite ratione providè adhibita laudem merentur quædam, quædam insufficientia, imò superstitiosa sunt; talem titulum quoque meretur cor leporis, infusum rapontici cum  $\mathcal{V}$ i & pauco  $\odot$  olivarum. Febrifugum *Strobelbergeri* ex Asaro, *Fabri* ex  $\odot$  Rosmarini, *Rondeletii* ex salviâ &c. item  $\odot$   $\Theta$ liad gtt. iij. vel vii. cum sirupi è cichorio  $\mathfrak{z}$ j. &  $\nabla$ æ absinth. vel marrub.  $\mathfrak{z}$ ß. haustum; emplastrum *Strobelberg.* ex terebinth. & araneis vivis, telis araneorum & gum.  $\mathcal{X}$ co. ad pulsus, & quæ sunt alia. Quæ si quod res est dicendum, si non infida, certè tamen plurima insufficientia sunt.

Reliqua, ut cor leporis in tres æquales partes divisum, & tribus vicibus assumptum, vel exsiccatum & appensum, item telæ araneorum intus assumptæ, de quò videatur *Wierus libro observationum pag. 43.* & ipsæ araneæ vivæ testis nunc cum inclusæ & collo appensæ; Scarabæus vivus fulvo linteolo involutus, & collo suspensus, ovum it. in ægroti  $\square$ na coctum, foraminibus pertusum, & in acervo formicarum defossus; hæc inquam, & quæ hujus farinae plura passim extant, meras aniles faciunt fabulas. De reliquis symptomatibus urgentibus notandum; quod ut ea ex propriis haurienda sunt oculis, ita nunquam sine respectu ad hypochondriorum dispositionem iis absolutè utendum sit. Sic malè consuleret ægro, quicumque hæmorrhagiam narium in quartanariis, stypticis sedare vellet, cui potius aperientia in superioribus proposita conveniunt. Simile iudicium ferendum est de cæteris.

## CAPUT XI.

### *De Fonte Diætetico.*

**T**Andem *Diæta* sex rerum non naturalium legitimo absolvitur regimine. Cujus si potissimum in febribus, nulla habetur ratio, frustrâ adhibentur quævis generosa remedia. Ut igitur nostra medicamenta optatum consequantur finem, hanc quoque subnectere operæ pretium putamus; Est verò illa *naturalis, vitalis & animalis*. In *naturali* cibi conveniunt boni succi & facilis concoctionis, non nimis crassi, quales sunt ova sorbilia, pulli gallinacei gallinæque, carnes hædinæ, aves montanæ, perdices, & si quis me iudice certet, inter aves turdus, inter quadrupedes gloria prima lepus. Pisces, licet omnes frigidæ sint naturæ & difficiles co-

ctu,



tu, meliores tamen saxatiles, cobites barbatulæ, funduli, troctæ, lucius, perca, &c. omnes tamen cum aromatibus, capparibus &c. conditi & parcius assumpti, aliàs viscidum reddunt chylum. Abstinentum contrà ab illis, qui crassum feculentum chylum generant, quales sunt omnes cibi minus  $\ominus$  iti, maceratæ carnes bovinæ, muria & aceto conditæ, fumo nimis indurata, suilla & nimis pingues, aliæ, anserinæ, anatum, & reliquarum avium palustrium, pisces item paludosi, & aëre siccati, ut anguillæ, carpiones &c. item acida sibi relicta, & ipsum acetum copiosè haustum, lacticia, dulcia ferè omnia, & leguminosa, maximè quoque nocet panis malè fermentatus, nec satis coctus, azymus, furfuraceus.

Potus sit paulò largior excepto tempore horroris, non tamen excessivus, cerevisia benè defecata, & amaricans non acescens, aut nimis recens. Cui etiam splenetica & hepatica herba infundi possunt, ut & febrifugæ, quales sunt, cent. minus, rosmarinus, melissa, scolopend. card. bened. &c. Vinum non sit  $\delta\lambda\upsilon\gamma\alpha\ \phi\acute{o}\rho\epsilon\gamma$  & acidum, sed Rhenanum, & quod huic proximè accedit.

Tempus cibandi sit statum, molliæque præmittantur crassioribus. Mensa non sit dubia; assumatur tantum, quantum pro viribus conservandis & restaurandis sufficit, sic tamen ut ne gravetur ventriculus. Illam verò vulgè methodum, quod in abstinentiâ & inediâ curationis spem ponit, approbare nequeo; cum hōc modō vires maximè prosterantur, quarum tamen robur in chronicis morbis præcipuam curationis spem facit. Ante exhibitionem tamen specifici; vesperi à cibo abstinere potest æger, vel saltim Platonice cœnare. Ut & si die paroxysmi iusculo contentus esse potest, usque dum finierit paroxysmus, mitius urent febriles faces.

In *Vitali* aër non sit crassus, frigidus nimis, aut nebulosus, sed temperatus, moderatè ad caliditatem inclinans, qui si natura talis non est, per artem producat. Nec semper ceu testudo domi situm contrahat æger, sed quandoque liberiori se committat aëri, quem quartana, præ aliis chronicis morbis, optimè perfert; sic ut hujus cum regione, potissimum boreali & frigidiori mutatio, sæpè malum terminet. Inprimis caveat sibi ab aëre nocturno, qui tūm viscerum tono tūm sanguinis circulo maximas fruit insidias. Ideò cubiculi fenestræ claudantur curiosè.

In *Animali* somnus non sit excessivus. *Vigilia* instante paroxysmo profunt, ut melius sibi ipsi succurrere, vel auxilium aliorum expetere possit æger. Lucubrationes nocturnæ compescendæ sunt. *Motus* jejuno ventriculo, usque ad sudorem exclusivè omni culpâ caret. *Quies* præ motu amica sanguinem & chylum vappescere facit; ut capiunt vitium ni moveantur aquæ. Alvus quotidie sit aperta, ideò à solis roborantibus & aromaticis calidioribus caveat sibi æger, eaque cum humectantibus interpolare discat. Venus quia omnes debilitat partes & refrigerat potenter, suspensa sit. *Animi pathemata* sanæ mentis subdantur jugo, mœror & tristitia fugentur potius, ne, ut solent, sedulam medici ludant operam, sed agrum cum morbo post terga reliquant.

TRIUNI DEO GLORIA.



**P**Ar Medicis, SCHOTTI, cursus sublimiùs urges,  
Hinc Te, quam meruis, laurea summa manet.

*Nobilissimo Dn. Doctorando hæc benevolâ manu,  
& cum voto omnigenæ prosperitatis adp.*

PRÆSES.

**N**ulla magis strages producere visitur orbe  
humani generis pestis quàm querquera febris,  
febris, quæ reliquis cunctis crudelior extans  
aut necat, aut vitiat corpus, mireq; fatigat.  
Inter eas quamvis melior quartana putari  
possit, nulla tamen mage subdola, nulla rebellis  
æquè, ac opprobrium medicorum dicitur unum.  
Tu verò tantum generosis ausibus hostem  
is oppugnatum doctis feliciter armis.  
I felix! sic Te victorem fama manebit.

*Nobil. & Clariss. Dn. Doctorando honores in Medicinâ,  
quos ambit, summos felicissimos ominor*

Georg. Wolffg. VVedelius D.

**Q**UARTANAM scopulum vocat medentum  
famæ, vulgus agreste, scandalumque:  
indigne tulit hoc Hygea dudùm,  
& mendax crotatum palàm repressit.

Non vulgare sapis, perite SCHOTTE,  
quartanamque febrem fugare tentas  
ausu plausibili, favente Phœbô &  
mitram purpuream simul ferente;  
quam faustam tibi comprecor, secundam  
famæ, milleque commodùm feracem!

*Faustæ congratulationis ergò Nob. & CL. Dn. Doctorando,  
Amico honoratissimo; pon.*

Augustinus Henricus Faschius,  
D. P. P.

